

C. arachnites Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, versomiliter pendulum, fere 100 cm longum; caulibus vaginis primum foliiferis omnino obtectis, dichotome ramosis, in axillis ramorum pseudobulbiferis, 5—7 mm diametro; pseudobulbis ovatis, compressis, 2-foliatis, 10—15 cm inter se distantibus, 3—5,5 cm longis, infra medium 1,5—2 cm latis; foliis linearibus obtusiusculis, basin versus paulo angustatis, usque ad 25 cm longis, 1—1,2 cm latis; inflorescentiis abbreviatis, unifloris, singulis vel paucis in axillis vaginarum caulis juvenilis natis, pedunculo brevi 1—1,5 cm longo, vaginis paucis fere omnino obtecto; bractea lanceolata, acuminata, ovarium duplo superante; floribus in genere inter minores, albidis, glaberrimis; sepalis e basi lanceolata elongato-acuminatis, intermedio 2,2 cm longo, lateralibus obliquis sublongioribus; petalis sepalis similibus, falcato-obliquis, sed brevioribus, c. 1,7 cm longis; labello parvulo, e medio 3-lobo, explanato 5 mm longo, inter apices loborum lateralium 4 mm lato, callo depresso apicem versus dilatato e basi usque in medium decurrente ornato, dimidio inferiore explanato semiorbiculari, lobis lateralibus rotundatis antice truncatis, lobo intermedio antico, quadrato, valde obtuso; columna semitereti, breviuscula, 4 mm longa, pede brevi; ovario cylindraceo, glabro, c. 5 mm longo.

Panama: Chiriqui, c. 4000 m ü. M. — no. 210.

Durch die lang ausgezogenen Sepalen und Petalen ist diese Art überaus charakteristisch und unter allen bisher beschriebenen sehr leicht zu erkennen. Es liegen einige sehr gut präparierte Stücke vor.