

Elleanthus muscicolus Schltr., nov. spec.

Epiphyticus, in ramis arboreum; rhizomate valde abbreviato, decumbente; caulibus erectis, fasciculatis, simplicibus, bene foliatis, teretiusculis, rigidulis, c. 2 mm diametro, vaginis foliorum arcte amplectentibus, striato-nervosis omnino obtectis; foliis erecto-patentibus, oblongis vel ligulato-oblongis, obtusis, subcoriaceis, glabris, 1—1,4 cm longis, medio vel infra medium 3—5 mm latis; racemis erectis, abbreviatis, distichis, dense pluri-(8—14-)floris, usque ad 1,7 cm longis; bracteis erecto-patentibus, primum imbricantibus, lanceolatis vel ovato-lanceolatis, obtusis, lateraliter compressis, flores superantibus et magna pro parte obtegentibus, subscariosis, glabris; floribus inversis, in genere inter minores, tenuibus; sepalis ovato-lanceolatis, acutis, 3-nerviis, basin versus extus substellato-furfuraceis, 3,5 mm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique ligulatis, obtusis, apicem versus sensim leviter dilatatis, 3-nerviis, glabris, sepala paululo superantibus; labello erecto, columnam amplectente, explanato circuito trapeziformi-quadrato, antice obtusissimo, leviter exciso, margine irregulariter denticulato, leviter undulato, basi concava corpusculis 2 minutis irregulariter ellipsoideis ornato, 3 mm longo, antice 3,5 mm lato; columna teretiuscula, glabra, c. 1 mm longa; ovario cylindraceo, furfuraceo, c. 2,5 mm longo.

Costa Rica: Ohne nähere Standortsangabe — C. Wercklé no. 143 (siehe auch unten).

Eine sehr charakteristische, kleine Art, die in den Blättern an *Epilyna* erinnert, aber eine typische *Elleanthus*-Infloreszenz aufweist. Die Blätter selbst sind entgegen denen von *Epilyna* gegliedert.