

Eurystyles Wawra.

Eurystyles auriculata Schltr., nov. spec.

Epiphytica, pusilla, ad 5 cm alta; radicibus more tribus fasciculatis, carnosulis, pilosis; foliis basilaribus rosulatis, erecto-patentibus, c. 6—8, spatulato-rhombeis, apiculatis, basi in petiolum latum angustatis, petiolo incluso usque ad 4 cm longis, usque ad 1,5 cm latis, glabris vel subglabris; scapo vulgo deflexo vel nutante, inflorescentia inclusa 6—6,5 cm longo, tereti, paucivaginulato, dense hispidulo; racemo more generis abbreviato, semiorbiculari-conico, dense plurifloro; bracteis lanceolatis, acuminatis, margine ciliato-serratis, flores conspicue (nunc duplo) superantibus; floribus in genere inter minores, glabris; sepalis anguste oblongo-ligulatis, obtusiusculis, extus nervo mediano serrulato-carinatis, univerviis, intermedio c. 5 mm longo, lateralibus obliquis, in cuniculum decurrentibus c. 7 mm longis; petalis anguste oblongo-ligulatis, obtusis; labello longius unguiculato, ungue lineari c. 3 mm longo, lamina obovata, in tertia parte apicali constricta, latiovata, obtusa, basi auriculis 2 carnosis, satis magnis donata, c. 3,5 mm longa, supra medium 1,6 mm lata; columna generis, gracili, apicem versus paulo dilatata, c. 3 mm longa, pede pro genere longo, c. 2 mm longo; ovario sessili, cylindraceo, glabro, c. 6 mm longo.

Costa Rica: Tablazo, um 1700 m ü. M. — A. et C. Brade no. 1076 blühend im August 1908; ohne nähere Standortsangabe. — A. et C. Brade no. 1187a.

Die Art ist vor allen übrigen durch die Form des Labellums gut gekennzeichnet. Auffallend sind vor allen Dingen die ziemlich dicken und verhältnismäßig großen Öhrchen der Lippe.

Die no. 1187 stellt eine sehr schwache kleine Pflanze dar, die infolge Mangels an Blüten nicht ganz sicher untergebracht werden kann, wahrscheinlich aber hierher gehört.

Das Auftreten einer Art der Gattung in Central-Amerika ist pflanzengeographisch besonders wichtig.