

N. (*minor*) foliis planis, spathis virentibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 601. Collect. 3. p. 172.**

Satyrium (*elatum*) bulbis fasciculatis crassis tomentosis, foliis radicalibus ovatis petiolatis, caule subnudo, nectario subtrilobo. *Swartz prod. 119.*

Satyrium erectum, foliis oblongis, petiolis vaginatis amplexicantibus, spica terminali, nectariis longissimis. *Brown. jam. 324.*

Helleborine foliis liliaceis, radice asphodeli minor. *Plum. cat. 9. Ejusd. ic. 184. t. 190.*

Hohe Neottie. W.

Habitat in Jamaica. 4.

* 3. NEOTTIA lanceolata. W. †

N. labello ovato indiviso, caule basi folioso, bracteis flore brevioribus, foliis lanceolatis obtusis. W.

Limodorum lanceolatum. *Aubl. guj. 2. p. 821.*

Helleborine purpurea asphodeli radice. *Plum. cat. 9. ejusd. ic. 176. t. 181. f. 2.*

Lanzettblättrige Neottie. W.

Habitat in Gujana, Indiaque occidentali. 4.

* 4. NEOTTIA diuretica. W. †

N. labello oblongo obtusiusculo, scapo vaginato, bracteis flores subaequantibus, petalis exterioribus reflexis, spica secunda, foliis linearibus. W.

Epipactis floribus uno versu dispositis vulgo Nuil. *Feuill. peruv. 2. p. 26. t. 17.*

Harnntreibende Neottie. W.

Habitat in Chili. 4.

* 5. NEOTTIA quadridentata. W. †

N. labello rotundato apice quadridentato, caule basi folioso, bracteis flores subaequantibus, spica secunda spiraliter torta, foliis oblongis obtusis. W.

Ophrys peruviana. *Aubl. guj. 2. p. 816.*

Helleborine spiralis flore albo. *Plum. cat. ic. 178. t. 183. f. 1.*

Vierzähnlige Neottie. W.

Habitat in India occidentali inque Gujana. 4.

6. NEOTTIA spiralis.

N. foliis radicalibus oblongis subpetiolatis, spica tortili,